

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS GARDNERELLA VAGINALIS

EMERSON JOSÉ DE MELO

CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ, MARINGÁ - PR

FABIANA SILVEIRA GARCIA

CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

SIDNEY EDSON MELLA JUNIOR

CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

ELIANE A. CAMPESATTO MELLA

CESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

Introdução: A Vaginose Bacteriana é uma das mais frequentes causas de doenças vaginais. É caracterizada pela presença de corrimento homogêneo, branco acinzentado e de células alvas ("clue cells"). A vaginose bacteriana mais comum é a causada pela bactéria Gardnerella vaginalis, como consequência de um desequilíbrio da flora vaginal, ocorrendo em todas as fases da vida de mulheres predispostas. Sua ocorrência é maior com a queda da imunidade, sobretudo no período pós-menstrual. **Objetivo:** Identificar a incidência de vaginose bacteriana causada pela bactéria Gardnerella vaginalis em mulheres de 18 a 50 anos no Município de Fênix, Paraná. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa de campo com entrevista a 30 (trinta) mulheres entre 18 e 50 anos de idade. As informações coletadas foram tabuladas, analisadas e apresentadas na forma de gráficos para facilitar a visualização dos resultados. O questionário foi composto por 14 questões, fornecendo informações a respeito da alimentação, do tipo de roupa utilizada, do nível de atividade sexual, da presença de corrimentos e sua frequência, da prevenção e do tratamento empregado pelas entrevistadas. **Resultados:** Das 30 mulheres entrevistadas, 33,3% têm entre 18 a 35 anos, 36,6% 35 à 45 anos e 30,1% mais de 45 anos de idade. Apenas 56% das mulheres acima de 45 anos praticam sexo regularmente, enquanto nas mulheres de 18 a 35 anos, 82% o fazem com frequência. Quanto ao tipo de vestuário, 66% das mulheres acima de 45 anos, se vestem com saias e vestidos, proporcionando maior conforto para seus órgãos genitais enquanto estes índices são bem inferiores nas mulheres mais jovens (35% nas mulheres entre 18 e 35 anos e 30% nas mulheres entre 35 e 45 anos). Todas as mulheres entrevistadas possuem roupas íntimas de algodão sendo 46%, 50% e 55% na seqüência da faixa etária apresentada. Das mulheres acima de 45 anos de idade, 55% procuram usar peças de algodão enquanto 54% das mais jovens preferem tecidos de lycra. Há presença não regular do corrimento em 72% das mulheres mais jovens e 60% nas mulheres de 35 a 45 anos de idade enquanto acima de 45 anos, há um índice maior de corrimento constante (78%). Quanto ao tratamento, os medicamentos mais utilizados foram metronidazol, tinidazol e secnidazol. **Conclusão:** No presente estudo, observou-se que fatores como idade, vestuário e uso de alguns medicamentos podem contribuir para a infecção vaginal por Gardnerella vaginalis provocando a vaginose bacteriana. Esta infecção pode causar sérias complicações, levando a mulher a constrangimentos em suas relações sexuais e total desconforto na sua vida cotidiana. Desta forma, é importante que se realize uma correta identificação da bactéria e caracterização da doença proporcionando que profissionais de saúde orientem as pacientes quanto à sintomatologia, transmissão, tratamento e prevenção de recidivas.

Palavras-chave: vaginose bacteriana; doenças vaginais; gardnerella vaginalis

emermelo@ig.com.br