



AGENTES ETIOLÓGICOS QUE CAUSAM GASTROENTERITE EM CÃES COM MAIS DE UM ANO DE IDADE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

João Cezar Varotto de Oliveira¹; Débora Mariano Cian²; Carlos Maia Bettini³; Rhubia Maria Jorge Lazaretti⁴

RESUMO: A gastroenterite canina é um quadro clínico caracterizado por vômito e diarreia, sendo esta na sua maioria sanguinolenta, além disso muitos cães podem exibir depressão e anorexia. Esse quadro possui, entre outras, várias etiologias: virais, parasitárias, bacterianas, intoxicações em geral e alimentares. Sendo que os quadros infecciosos são considerados os mais importantes por serem de relativa mortalidade e pelo risco de contaminação de outros animais inclusive o homem. A presente proposta deste projeto de pesquisa será verificar a prevalência de agentes etiológicos que causam gastroenterite em 40 cães provenientes de diferentes bairros do município de Maringá, atendidos no Hospital Veterinário Prontodog e no Hospital Veterinário do CESUMAR durante o período de 2011 e 2012. Os animais serão submetidos a exames clínicos meticulosos, e seus dados serão transferidos para uma ficha da qual constam informações pertinentes à identificação, como número do registro na clínica, proprietário, nome do cão, raça, idade, sexo, procedência e bairro de origem, bem como os dados clínicos do paciente, a queixa principal, sinais e sintomas, suspeita clínica e resultados de exames complementares realizados. através de testes sorológicos e de testes coprológicos. Para o diagnóstico será coletado 2 ml de sangue para a realização de ELISA que irá indicar a presença de um antígeno viral ou anticorpo contra o vírus no sangue, e de no mínimo 2 mg de material fecal para cada método de exame coprológico (Inspeção macroscópica, técnica de flutuação fecal convencional e de flutuação-centrifugação das fezes em açúcar pela técnica de Sheather; e exame pela técnica de concentração de Baermann). Durante o período do levantamento, todos os cachorros apresentando o quadro de gastroenterite devido a agentes etiológicos serão acompanhados clinicamente pelos acadêmicos, recebendo quando necessária terapia de suporte, tratamento para a infecção e internamento, para conter as infecções secundárias e oportunistas, bem como a desidratação, anemia e a desnutrição. Os dados quantitativos serão submetidos à análise de variância e pós teste de Tukey. Espera-se identificar a prevalência de agentes etiológicos que causam gastroenterite na população canina no município de Maringá, bem como descrever o perfil dos cães portadores dessas infecções intestinais, favorecendo o diagnóstico o tratamento e instituir medidas profiláticas que minimizem a disseminação dessas doenças.

PALAVRAS-CHAVE: Cães; diarreia; Gastroenterite; Maringá; vômito.