

O USO DO COPO NA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES: EXISTE UM MODELO IDEAL?

Priscila Amanda Ramos Galego¹; Cristiane Faccio Gomes²

RESUMO: O objetivo do estudo será caracterizar e comparar dois modelos de copo durante o oferecimento da dieta a lactentes, visando verificar qual o modelo que forneça maiores benefícios para sua alimentação. Os sujeitos do estudo serão 30 lactentes a termo, ambos os gêneros, com até cinco dias de vida, em alojamento conjunto e aleitamento materno exclusivo, sem malformações de cabeça e pescoço ou síndromes que alterem a dinâmica oral, sem intercorrências pós-natais. Para a realização do estudo os materiais utilizados serão copo descartável de café, copo Suzana de vidro, protocolo de observação, máquina fotográfica SONY 7.2 Mega Pixels, babador de pano e balança digital da marca WELMY. O estudo será realizado em um Hospital Maternidade filantrópico fundado em 1970, localizado no de município de Ivaiporã – Paraná. Os procedimentos para a coleta de dados consistirão, inicialmente, em aprofundamento do tema de estudo através de leitura crítica de livros-textos, artigos de periódicos e artigos obtidos em bases de dados da *Internet*. Após a elaboração do projeto de pesquisa e a autorização da instituição hospitalar o projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do CESUMAR. Em seguida, após aprovação do Comitê de Ética e autorização do chefe do setor a pesquisadora fará visitas periódicas à maternidade para realizar a coleta de dados nos momentos em que os lactentes receberão à alimentação por copo. As mães serão orientadas sobre os objetivos da pesquisa e caso concordem em participar, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). A pesquisadora levará o lactente e a mãe para um local tranquilo, lá posicionará o bebê com o babador seco e em seguida oferecerá o leite de acordo com a dieta prescrita em prontuário médico e com a técnica descrita na literatura. O oferecimento do leite será realizado com a divisão da dieta nos dois modelos de copo, onde em cada copo será colocada a metade da dieta indicada, primeiro com um e depois com o outro e como critério de escolha de qual copo deverá ser utilizado primeiro será realizado um sorteio. O babador será trocado e pesado antes e após o oferecimento de cada copo. As informações obtidas serão anotadas em um Protocolo de Observação. A filmagem será realizada com a câmera a uma distância de 30 cm, posicionada lateralmente à cavidade oral do lactente e durante no mínimo 1 minuto e posteriormente essas filmagens serão observadas para auxiliar na análise.

PALAVRAS-CHAVE: alimentação; lactentes; copo.

¹ Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário de Maringá – CESUMAR. Maringá – Paraná. Programa de Bolsas de Iniciação Científica do Cesumar (PROBIC). priscilamanda@hotmail.com

² Orientadora e docente do Centro Universitário de Maringá – CESUMAR. crisgomes@cesumar.br