



LESÕES POTENCIALMENTE MALIGNAS: ANÁLISE RETROSPECTIVA DE CASOS ATENDIDOS EM UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ-PR

Hellen Castelini¹, Ana Regina Casaroto Moreschi²

¹Acadêmica do Curso de Odontologia, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, Maringá-PR. Programa de Iniciação Científica da UniCesumar (PIC). hellencastelini@gmail.com

²Orientadora, Doutora, Docente do Curso de Odontologia, UNICESUMAR

RESUMO

A maioria dos casos de câncer de boca são precedidos por alterações clínicas visíveis na mucosa bucal, denominadas lesões potencialmente malignas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde as principais lesões potencialmente malignas incluem a leucoplasia, eritroplasia, queilite actínica e o líquen plano. A avaliação do grau de malignidade do tecido é realizada mediante uma biópsia incisiva. Microscopicamente é observado se o tecido apresenta sinais de displasia epitelial, ou seja, um conjunto de sinais presentes que diferem do normal e indicam malignidade. Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo retrospectivo e observacional dos casos de lesões potencialmente malignas bucais atendidos no projeto de lesões bucais do Centro Universitário Cesumar (PROLEB/ UniCesumar), avaliar a sua prevalência, e correlacionar o grau de displasia epitelial com as demais variáveis expostas. A presente análise será realizada através da coleta de dados dos prontuários dos atendimentos realizados na clínica odontológica pelo projeto PROLEB/UniCesumar, nos períodos de vigência 2004-2010 e 2014-2015. As variáveis coletadas serão: idade, gênero, etnia, atividade ocupacional, hábitos nocivos, localização anatômica, lesão fundamental, hipótese diagnóstica, grau de displasia, tratamento, preservação e transformação maligna. Para categorizar as variáveis será utilizado o teste qui-quadrado de Pearson com nível de significância de 5%. Com os resultados encontrados, espera-se, além de determinar a prevalência de casos de lesões atendidos, obter um material informativo para alertar os cirurgiões dentistas quanto a necessidade de um diagnóstico precoce das lesões potencialmente malignas no intuito de diminuir as estimativas de novos casos de câncer de boca.

PALAVRAS-CHAVE: Lesões potencialmente malignas, displasia epitelial, prevalência.